



Esquema de Vacunación

Enfermedad a Prevenir	Vacunas	Posología
Hepatitis A Adulto	Avaxim (160)	2 dosis: 0 y 6 meses
Hepatitis A Infantil	Avaxim (80)	2 dosis: Se recomienda dosis de refuerzo 6 meses después de la primera inyección.
Hepatitis A Adulto	Havrix adulto	2 dosis: 0 y 6 meses
Hepatitis A Infantil	Havrix junior	2 dosis: Se recomienda dosis de refuerzo 6 meses después de la primera inyección.
Hepatitis A y B	Twinrix	Esquema de vacunación: a) Adultos y adolescentes desde 16 años: 3 dosis, 0, 1 y 6 meses. b) Niños a partir de 1 año y hasta los 15 años: 2 dosis, esquema de 0 y 6 meses.
Hepatitis B Adulto	Recomvax B Adulto	3 dosis: 0, 1 y 6 meses.
Hepatitis B Infantil	Recomvax B Infantil	3 dosis: 0, 1 y 6 meses.
Hepatitis B Adulto	Engerix B adulto	3 dosis: 0, 1 y 6 meses.
Hepatitis B Infantil	Engerix B junior	3 dosis: 0, 1 y 6 meses.
Rotavirus	Rotarix	2 dosis oral con intervalo entre dosis de al menos 4 semanas.
Rotavirus	Rotateq	3 dosis oral con intervalo entre dosis de al menos 4 semanas.
Neumococo	Pneumo 23	Una (1) dosis No administrar refuerzo antes de un período de 5 años.
Virus Papiloma Humano	Cervarix	3 dosis 0, 1 y 6 meses
Virus Papiloma Humano	Gardasil	3 dosis a los 0, 2 y 6 meses
Varicela	Zóster Biken	Una (1) dosis en niños mayores de 1 año de edad
Varicela	Zóster Varilrix	Una (1) dosis en niños mayores de 1 año de edad
Neumococo y H. Influenzae no tipificable	Synflorix	Desde las 6 semanas a 6 meses 3 dosis con 1 mes de intervalo, desde los 7 meses de edad a 11 meses 2 dosis con un mes de intervalo, desde los 12 meses de edad hasta los 23 meses 2 dosis con 2 meses de intervalos.
Neumococo	Prevenar	Niños de 2 a 24 meses 4 dosis: 2, 4 y 6 meses de edad y una 4 dosis entre los 12 y 15 meses de edad.
Haemophilus Influenzae tipo B	Acthib	Antes de los 6 meses de edad: 3 dosis 2, 4 y 6 meses de edad.
Vacuna Hexavalente (Ag hep, Polio, B. Pertussis, H. Influenzae, T. Diftérico y T. Tetánico)	Infanrix	3 dosis, respetar intervalo de al menos un mes entre las dosis.
Difteria, Tétanos y Pertusis	Adacel	Una (1) dosis
Fiebre Tifoidea	Typhim VI	Una (1) dosis
Fiebre Amarilla	Stamaril	Una (1) dosis, sólo en vacunatorios internacionales. Recomienda dosis de refuerzo cada 10 años.
Vacuna conjugada H. Influenzae tipo b, combinada con pertussis, toxoide diftérico y tetánico.	Actacel	3 dosis desde los 2 meses de edad, con intervalos de 1 o 2 meses. Dosis de refuerzo 1 año después de la 3ª dosis.
Meningitis por meningococo	Meningo A + C	1 dosis a partir de los 18 meses de edad.
Cólera y diarrea por ETEC	Dukoral	2 dosis con intervalo mínimo de 1 semana y máximo de 6 semanas. Sobre los 6 años. Suspensión oral.
Tétanos	Tetavax	3 dosis con intervalo de 4 a 6 semanas, seguidas de un refuerzo a los 6 a 12 meses después de la segunda dosis.